Schlüsselexperimente der Kern- und Teilchenphysik

Messung der direkten CP Verletzung im Kaonzerfall

Jun Nian
01.06.2007

Übersicht

- Motivation
- Grundbegriffe
- Phänomenologische Beschreibung
(einschl. Experiment von Cronin und Fitch)
- Experimente (NA48, KTeV)
- Zusammenfassung und Referenzen

Motivation

- Materie-Antimaterie Asymmetrie
- Wo ist Antimaterie?
- Mögliche Erklärung:
CP Verletzung im Quark-Sektor
(K , B , D)
Aber nicht genug ...
- CP Verletzung im Lepton-Sektor?

Operatoren

Für ein Teilchen:

P Operator:

$$P\psi(\vec{x}) = \psi(-\vec{x})$$

C Operator:

$$C|A\rangle = \eta_C |\bar{A}\rangle$$

CP Operator:

$$CP|A(\vec{x})\rangle = \eta_C |\bar{A}(-\vec{x})\rangle$$

CP-Eigenwerte von 2π und 3π

Für ein System A,B,... :

A, B, ... sind Eigenzustände von CP-Operator.

$$\eta_{CP}(A, B, \dots) = \eta_{CP}(A) \cdot \eta_{CP}(B) \cdot \dots \cdot (-1)^L$$

$$J^P(\pi^\pm) = 0^- \quad J^{PC}(\pi^0) = 0^{-+}$$

$$\begin{aligned} K(L=0) \rightarrow 2\pi(\pi^0\pi^0, \pi^+\pi^-) &\longrightarrow CP|2\pi\rangle = +|2\pi\rangle \\ K(L=0) \rightarrow 2\pi(\pi^0\pi^0\pi^0, \pi^+\pi^-\pi^0) &\longrightarrow CP|3\pi\rangle = -|3\pi\rangle \end{aligned}$$

Eigenzustände von Kaonen

Zur Beschreibung des neutralen K-Systems:

$$\text{Flavor-Eigenzustände} \quad \left\{ \begin{array}{l} |K^0\rangle = |d\bar{s}\rangle \quad \longrightarrow \quad S|K^0\rangle = +|K^0\rangle \\ |\bar{K}^0\rangle = |\bar{d}s\rangle \quad \longrightarrow \quad S|\bar{K}^0\rangle = -|\bar{K}^0\rangle \end{array} \right.$$
$$\longrightarrow CP|K^0\rangle = |\bar{K}^0\rangle, CP|\bar{K}^0\rangle = |K^0\rangle$$

$$\text{CP-Eigenzustände:} \quad |K_1\rangle := \frac{1}{\sqrt{2}} (|K^0\rangle + |\bar{K}^0\rangle) \quad CP = +1$$

$$|K_2\rangle := \frac{1}{\sqrt{2}} (|K^0\rangle - |\bar{K}^0\rangle) \quad CP = -1$$

Frage: Sind K_1 und K_2 identisch mit beobachteten K_S und K_L ?

$$K_L = K_2 ?$$

Frage: Sind K_1 und K_2 identisch mit beobachteten K_S und K_L ?

→ Frage: Sind K_S und K_L auch CP-Eigenzustände?

$$K_1 (CP = +1) \rightarrow 2\pi (CP = +1)$$

$$K_2 (CP = -1) \rightarrow 3\pi (CP = -1)$$

$$K_S \rightarrow 2\pi (CP = +1)$$

$$K_L \rightarrow 3\pi (CP = -1)$$

→ Frage: Gibt es den Zerfall $K_L \rightarrow 2\pi$?

Suche man
das!

Experiment von Cronin & Fitch (1963, Brookhaven, AGS)

**James Watson
Cronin**

**Val Logsdon
Fitch**

(1980 Nobelpreisträger)

CP Verletzung:
 $K_L \rightarrow \pi\pi$

Prinzip:

$K_L \rightarrow \pi\pi$ → Nur zwei Produkte

→ $\theta = 0$ → $\cos \theta = 1$

Experiment von Cronin & Fitch (Brookhaven, AGS, 1963)

Brookhaven: RHIC+AGS

Aufbau des Experimentes von Cronin & Fitch

Ergebnis des Experimentes von Cronin & Fitch

■ Ergebnis:

45 ± 9 2π -Ereignisse
 aus 22700 K_L Zerfällen

→ $\Gamma(K_L \rightarrow 2\pi) \approx 10^{-3}$

→ K_L kein CP-Eigenzustand

→ CP Verletzung in schwacher WW

Analyse des Zerfalls $K_L \rightarrow 2\pi$

$\varepsilon \neq 0$ $\longrightarrow$ Indirekte CP Verletzung
 $\varepsilon' \neq 0$ $\longrightarrow$ Direkte CP Verletzung

Frage: Wie misst man ε' ?

Amplitude-Verhältnisse und Doppelverhältnis

Amplitude-
Verhältnisse:

$$\eta_{00} := \frac{\langle \pi^0 \pi^0 | T | K_L \rangle}{\langle \pi^0 \pi^0 | T | K_S \rangle} \quad \eta_{+-} := \frac{\langle \pi^+ \pi^- | T | K_L \rangle}{\langle \pi^+ \pi^- | T | K_S \rangle}$$

Komplexe Größen

Nicht zu messen!

Zu messende Größe:

Doppelverhältnis:

$$R := \frac{\Gamma(K_L \rightarrow \pi^0 \pi^0) / \Gamma(K_S \rightarrow \pi^0 \pi^0)}{\Gamma(K_L \rightarrow \pi^+ \pi^-) / \Gamma(K_S \rightarrow \pi^+ \pi^-)} = \left| \frac{\eta_{00}}{\eta_{+-}} \right|^2$$

Vereinfachungen

1. Durch Isospin-Betrachtung: $\eta_{00} \approx \varepsilon - 2\varepsilon'$ $\eta_{+-} \approx \varepsilon + \varepsilon'$

2. $\text{Arg}(\eta_{00}) \approx \text{Arg}(\eta_{+-})$ $\text{Arg}(\varepsilon) \approx \text{Arg}(\varepsilon')$

$$\longrightarrow R := \frac{\Gamma(K_L \rightarrow \pi^0 \pi^0) / \Gamma(K_S \rightarrow \pi^0 \pi^0)}{\Gamma(K_L \rightarrow \pi^+ \pi^-) / \Gamma(K_S \rightarrow \pi^+ \pi^-)} = \left| \frac{\eta_{00}}{\eta_{+-}} \right|^2 \approx 1 - \underbrace{6 \cdot \text{Re}\left(\frac{\varepsilon'}{\varepsilon}\right)}$$

□ $10^{-6} / 10^{-3} = 10^{-3}$
Sehr genaue Messung!

Zurück zur Frage: Wie misst man ε' ? Man misst ε' nicht!

$R \neq 1 \longrightarrow \varepsilon' \neq 0 \longrightarrow$ Direkte CP Verletzung

Experimente zur direkten CP Verletzung

Direkte CP Verletzung: $R \neq 1$ oder $\text{Re}(\varepsilon'/\varepsilon) \neq 0$

NA31(CERN, 1988): $\text{Re}(\varepsilon'/\varepsilon) = (23.0 \pm 6.5) \times 10^{-4}$

E731(FNAL, 1989): $\text{Re}(\varepsilon'/\varepsilon) = (7.4 \pm 5.9) \times 10^{-4}$

stimmen nicht überein!

Neue Experimente:
CERN: NA48; FNAL: KTeV

um Fehler zu verringern

NA48(CERN, SPS, 1997-1999)

CERN: LHC/LEP+SPS

Prinzip der Strahlen-Erzeugung

$$R := \frac{\Gamma(K_L \rightarrow \pi^0 \pi^0) / \Gamma(K_S \rightarrow \pi^0 \pi^0)}{\Gamma(K_L \rightarrow \pi^+ \pi^-) / \Gamma(K_S \rightarrow \pi^+ \pi^-)}$$

K_S und K_L Strahlen { Gleichzeitig erzeugt
Gleiche Zerfallsregion

Strahlen-Erzeugung von NA48

Rekonstruktion von $\pi^+\pi^-$ & K_S Anti-Counter (AKS)

Rekonstruktion von $\pi^+\pi^-$

K_S Anti-Counter
(AKS)

Prinzip des Detektors

Außerdem: Hodoscope (t) , Muon-Anticounter ($K_L \rightarrow \pi\mu\nu$)

Detektor von NA48

Untergrund-Korrekturen

Korrekturen α_{SL} und α_{LS}

α_{SL} : Wahrscheinlichkeit, K_S als K_L misidentifiziert

α_{LS} : Wahrscheinlichkeit, K_L als K_S misidentifiziert

Zur Bestimmung von α_{SL}^{+-} und α_{LS}^{+-} :

Aus dem Diagramm kann man bestimmen:

$$\alpha_{SL}^{+-} = (1.63 \pm 0.03) \times 10^{-4}$$

$$\alpha_{LS}^{+-} = (10.649 \pm 0.008)\%$$

Mit anderen Methoden kann man bestimmen:

$$\Delta\alpha_{LS} := \alpha_{LS}^{00} - \alpha_{LS}^{+-} = (4.3 \pm 1.8) \times 10^{-4}$$

$$\Delta\alpha_{SL} := \alpha_{SL}^{00} - \alpha_{SL}^{+-} = (0.0 \pm 0.5) \times 10^{-4}$$

Korrekturen und Ergebnis von NA48

	in 10^{-4}	
$\pi^+\pi^-$ trigger inefficiency	-3.6	± 5.2
AKS inefficiency	+1.1	± 0.4
Reconstruction of $\pi^0\pi^0$ of $\pi^+\pi^-$	—	± 5.8
Background to $\pi^0\pi^0$ to $\pi^+\pi^-$	+2.0	± 2.8
Beam scattering	-5.9	± 2.0
Accidental tagging	+16.9	± 3.0
Tagging inefficiency	-9.6	± 2.0
Acceptance statistical	+8.3	± 3.4
Acceptance systematic	—	± 3.0
Accidental activity	+26.7	± 4.1
Long term variations of K_S/K_L	—	± 4.0
Accidental activity	—	± 4.4
Long term variations of K_S/K_L	—	± 0.6
Total	+35.9	± 12.6

Korrekturen und Fehler von R

R als eine Funktion von Kaonenergie

$$\text{Re}(\varepsilon'/\varepsilon) = (15.0 \pm 1.7(\text{stat}) \pm 2.1(\text{sys})) \times 10^{-4}$$

KTeV(FNAL, Tevatron, 1996-1997)

KTeV (**K**aon
Experiment at
Tevatron):
E799 + E832

Zerfallsregion und Magnet von KTeV

Zerfallsregion

Magnet

Detektor und Ergebnis von KTeV

$$\text{Re}(\varepsilon' / \varepsilon) = (23.2 \pm 3.0(\text{stat}) \pm 3.2(\text{sys}) \pm 0.7(\text{MC})) \times 10^{-4}$$

Zusammenfassung

- Drei Basen vom Kaon-System:
 $\{|K^0\rangle, |\bar{K}^0\rangle\}$, $\{|K_1\rangle, |K_2\rangle\}$, $\{|K_S\rangle, |K_L\rangle\}$
- Zwei Arten von CP Verletzung:
 $\varepsilon \neq 0$ $\longrightarrow$ Indirekte CP Verletzung
 $\varepsilon' \neq 0$ $\longrightarrow$ Direkte CP Verletzung
- Drei Experimente:
Indirekte CP Verletzung: Cronin, Fitch, 1963
Direkte CP Verletzung: NA48 & KTeV

Referenzen

- CP Violation and K^0 Decays, K.Kleinknecht, 1976. Ann. Rev. Nucl. Sci. 26:1-50
- A Precise Measurement of the Direct CP Violation Parameter $\text{Re}(\varepsilon'/\varepsilon)$, A.Lai et al., hep-ex/0110019v1
- Measurements of Direct CP Violation, CPT Symmetry, and Other Parameters in the Neutral Kaon System, A. Alavi-Harati et al., hep-ex/0208007v1
- Webseite von NA48:
<http://na48.web.cern.ch/NA48/>
- Webseite von KTeV:
<http://kpassa.fnal.gov:8080/public/ktev.html>