Strukturbildung und Selbstorganisation weit weg vom Gleichgewicht

Heinz Horner
Inst. f. Theor. Physik
Uni Heidelberg
horner@tphys.uni-heidelberg.de

13. Okt. 2007

Literatur:

- H. Meinhard: *Models of biological pattern formation*, Academic Press, London (1982)
frei erhältlich unter <http://www.eb.tuebingen.mpg.de/meinhardt>
- H. Meinhard: *The Algorithmic Beauty of Sea Shells*, Springer, Heidelberg (2003)
- H. Haken: *Synergetics, an introduction*, Springer, Heidelberg (1977/1983)
Advanced synergetics, Springer, Heidelberg (1983/1987)

Energie- und Entropiebilanz der Erde

Direkte Entropieerzeugung
(z.B. Wärmeleitung)?

langsam!

Energiekaskade -> Strukturbildung ->
(belebte Natur) -> -> Dissipation

Maximale Entropieproduktion?

Beispiele:

Konvektion

Musterbildung in der belebten Natur

Konvektion, Taylor-Instabilität

Abfolge der Muster:

Laminare Strömung → Gerade Rollen →
Gewellte Rollen → Gerade turbulente Rollen

Navier-Stokes-Gleichung

$$\partial_t \vec{u}(r, t) = (\vec{u}(r, t) \cdot \nabla) \vec{u}(r, t) - \nabla (\vec{u}(r, t) \cdot \vec{u}(r, t))$$

$$+ \nu \Delta \vec{u}(r, t)$$

Dissipation

Konvektion (nichtlinear)

Turbulente Strömung:

Energiekaskade von großen
zu kleinen Längenskalen
Energiedissipation auf kleinster Skala

Flussinstabilität (viscous fingering)

Hele-Shaw Zelle

Eine Flüssigkeit geringer Viskosität (Wasser, Luft)
verdrängt eine Flüssigkeit hoher Viskosität (Öl)

Selbstähnliche Strukturen

Strukturbildung, Gierer Meinhard Modell

Reaktions-Diffusionsgleichungen (nichtlinear)

Aktivator (autokatalytisch)

$$\partial_t A(x, t) = -(A(x, t) - A_o) + \frac{A(x, t)^2}{B(x, t)} + D_A \partial_x^2 A(x, t)$$

Inhibitor (aktiviert durch A)

$$\partial_t B(x, t) = -C B(x, t) + A(x, t)^2 + D_B \partial_x^2 B(x, t)$$

Strukturbildung, Gierer Meinhard Modell

Reaktions-Diffusionsgleichungen (nichtlinear)

Aktivator (autokatalytisch)

$$\partial_t A(x, t) = -(A(x, t) - A_o) + \frac{A(x, t)^2}{B(x, t)} + D_A \partial_x^2 A(x, t)$$

Inhibitor (aktiviert durch A)

$$\partial_t B(x, t) = -C B(x, t) + A(x, t)^2 + D_B \partial_x^2 B(x, t)$$

Ohne Diffusion (durchmischt):
Zeitlich periodisch, Grenzyklus

Strukturbildung, Gierer Meinhard Modell

Reaktions-Diffusionsgleichungen (nichtlinear)

Aktivator (autokatalytisch)

$$\partial_t A(x, t) = -(A(x, t) - A_o) + \frac{A(x, t)^2}{B(x, t)} + D_A \partial_x^2 A(x, t)$$

Inhibitor (aktiviert durch A)

$$\partial_t B(x, t) = -C B(x, t) + A(x, t)^2 + D_B \partial_x^2 B(x, t)$$

Mit Diffusion: $D_B > D_A$
Räumliche Muster: Gradient

Strukturbildung, Gierer Meinhard Modell

Reaktions-Diffusionsgleichungen (nichtlinear)

Aktivator (autokatalytisch)

$$\partial_t A(x, t) = -(A(x, t) - A_o) + \frac{A(x, t)^2}{B(x, t)} + D_A \partial_x^2 A(x, t)$$

Inhibitor (aktiviert durch A)

$$\partial_t B(x, t) = -C B(x, t) + A(x, t)^2 + D_B \partial_x^2 B(x, t)$$

Mit Diffusion: $D_B > D_A$
Räumliche Muster: Periodisch

Strukturbildung, Gierer Meinhard Modell

Genetische Grundlage: Drosophila - Mensch

Strukturbildung,
Gierer Meinhard Modell
(modifiziert)